

Divergan F

Clarificante preventivo frente a fenómenos oxidativos en mostos y vinos.

CARACTERÍSTICAS

Divergan-F es un clarificante llamado polivinilpolipirrolidona (PVPP) capaz de eliminar de forma selectiva compuestos fenólicos causantes del pardeamiento de los mostos y vinos. No modifica el perfil organoléptico del vino, aunque los vinos tratados con Divergan-F intensifican la frescura del vino al desaparecer las notas oxidadas.

Divergan-F actúa frente a catequinas y leucoantocianos impidiendo que el vino evolucione hacia tonos oxidados y disminuyendo la fracción de sulfuroso combinado.

APLICACIÓN

En mostos y vinos blancos y rosados, Divergan-F elimina los compuestos responsables de la oxidación, mejorando las características organolépticas de los vinos tratados.

En vinos que ya han sufrido procesos de oxidación, Divergan-F consigue reducir el oscurecimiento producido por las reacciones de oxidación.

CUALIDADES ORGANOLÉPTICAS

La aplicación de Divergan-F consigue un afinado en las características gustativas de los vinos tratados.

COMPOSICIÓN

Polivinilpolipirrolidona (PVPP).

DOSIS

Mosto

Tratamiento preventivo: 10-30 g/hl

Tratamiento curativo: 30-50 g/hl

Vino blanco y rosado

Con ligera oxidación: 15-30 g/hl

Con fuerte oxidación: 30-50 g/hl

Vino tinto: 10-50 g/hl

Dosis máxima legal: 80 g/hl

Atención: Se recomienda realizar ensayos de laboratorio para determinar la dosis de empleo óptima, pues depende en gran medida de las características propias de cada vino.

MODO DE EMPLEO

1. Disolver la cantidad de Divergan-F a utilizar en 10 veces su peso en agua. Asegurar una preparación homogénea.
2. Adicionar al volumen a tratar, mediante remontado para asegurar su completa homogeneización en el vino.

Precauciones de trabajo:

Para que el uso de Divergan-F sea efectivo es importante mantener la dispersión homogénea sobre todo el volumen de mosto o vino a tratar.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

EP 827 (rev.2)

Humedad (%)	< 5
Cenizas sulfatadas (%)	< 0.4
N,N divinilimidiazolindinona [mg/kg]	< 2
N- Vinilpirrolidona [mg/kg]	< 10
Solubilidad (en agua) [%]	< 0.5
pH (1%)	5 - 8
Nitrógeno total [%]	11 - 12.8
Efectividad de absorción de catequina [%]	> 55
Sulfatos [g/kg]	< 1
Metales pesados [mg/kg]	< 10
As [mg/kg]	< 2
Pb [mg/kg]	< 2
Hg [mg/kg]	< 1
Zn [mg/kg]	< 5
Cd [mg/kg]	< 1

ASPECTO FÍSICO

Polvo fino de color blanco.

CONSERVACIÓN

Conservar en el envase de origen, en lugar fresco y seco, ausente de olores.

Una vez abierto debe emplearse lo antes posible.

Fecha óptima de consumo: 3 años.

MODO DE CONSERVACIÓN

Conservar en el envase de origen, en lugar fresco y seco, ausente de olores.

Una vez abierto debe emplearse lo antes posible.

Fecha óptima de consumo: 5 años.

RGSEAA: 31.00391/CR

Producto conforme con el Códex Enológico Internacional y el Reglamento (UE) 2019/934 y sucesivas modificaciones.