

Maxibent FL

Bentonita específica para flotación de mostos.

CARACTERÍSTICAS

Maxibent FL permite aumentar la velocidad de separación de las burbas del mosto, mejorando así el rendimiento durante el proceso de flotación.

APLICACIÓN

Desafangado de mostos mediante el proceso de flotación.

CUALIDADES ORGANOLÉPTICAS

Maxibent FL acorta el tiempo de permanencia en contacto de los fangos con el mosto, evitando la cesión de aromas y sabores no deseados.

DOSIS

Vino terminado: 20 - 50 g/hl

Atención: Las dosis varían en función del grado de limpidez deseado a la finalización del proceso.

Se recomienda realizar ensayos previos en el Shaker y utilizar el variador de dosificación para optimizar la dosis.

COMPOSICIÓN

Bentonita activada con sodio en polvo.

MODO DE EMPLEO

1. Llenar el depósito de preparación hasta el 70-80% de su capacidad ó hasta cubrir las hélices del depósito con agua.

2. Adicionar Maxibent FL en proporción 1/10 lentamente, intentando que caiga directamente en el ciclón de agitación. Agitar durante 2 horas hasta conseguir su completa disolución.
3. Rellenar con agua fría hasta completar el volumen total.
4. Dejar hinchar durante 1 hora, aproximadamente.
5. Adicionar mediante bomba dosificadora incorporada en el equipo de flotación.

ASPECTO FÍSICO

Polvo de color beige.

PRESENTACIÓN

Envases de 25 kg.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

EP 782 (rev.3)

Humedad (%)	< 15
Pb [mg/kg]	< 5
Hg [mg/kg]	< 1
As [mg/kg]	< 2
Fe [mg/kg]	< 600
Al [g/kg]	< 2.5
Ca + Mg (meq/100g)	< 100
Na [g/kg]	< 35

CONSERVACIÓN

Conservar en el envase de origen, en lugar fresco y seco, ausente de olores.

Una vez abierto debe emplearse lo antes posible.

Fecha óptima de consumo: 5 años.

RGSEAA: 31.00391/CR

Producto conforme con el *Códex Enológico Internacional* y el *Reglamento (UE) 2019/934* y sucesivas modificaciones